

FloraMax

Tabela e dozave



FloraMax VegaFlora A+B

VegaFlora A+B është një lëndë ushqyese profesionale me 2 pjesë për sistemet hidroponike, dhe ose fibra të arrave të kokosit:

- Siguron ushqyerje më të favorshme nga fidani te korrja.
- Përqendrim i lartë i pH dhe plotësisht i tretshëm. Nuk i bllokton tubat dhe filtrat.
- E lehtë për t'u përdorur. Proceduat për përgatitjen e dozës nuk janë të lodhshme - thjesht mateni, derdhni, pastaj përziejeni. Për dheun dhe fibrat e arrës së kokosit, rregullimi i pH në pjesën më të madhe të ujërave nuk është i nevojshëm.
- Nuk përmban përbërës të panevojshëm. Kjo stimulon aroma më të mira.
- Përmban përbërës të kategorisë premium.



Root-XS

Siguron harlisje të rrënjës. Minimizon vyshkjen nga zhvendosja dhe ndihmon në nxitjen e një cikli më të shpejtë të kulturave. Prodhon gjethe më të gjelbra, të shëndetshme dhe fruta me më pak shenja fishkajeje.



Resin-XS

Fuqizuesi #1 i lulëzimit për kultivues të përkushtuar. Formulimi i saj unik stimulon çeljen e luleve dhe ndihmon në nxitjen e peshës më të madhe të frutave. Është pa hormone dhe nuk shkakton erë të keqe ose grumbullime në rezervuar.



Flowering Enhancer

Aditiv tre në një për çeljen e luleve që e bën më të lehtë kultivimin dhe rrit madhësinë e luleve:

1. Është një aditiv fosfori dhe kaliumi,
2. Përmban gjithashtu kalcium, magnez dhe hekur,
3. Ndihmon në ruajtjen e pH nën 6.5.



OrganaBud

Aditiv i nevojshëm organik. Përmban leshterik deti që është shumë i tretshëm. Afati i jetëgjatësisë së tij prej 3 plus vjetësh siguron që lënda ushqyese të qëndrojë e pastër dhe të mos shkaktojë grumbullime të padëshiruara në rezervuar ose tuba.



Clone Spray

Ndihmon në përmirësimin e shkallës së suksesit dhe shëndetit të kloneve dhe fidanëve. Ai ka një surfaktant të integruar.



System Maintenance

Parandalon bllokimet e lëndëve ushqyese. Është në përputhje me aditivët organikë dhe bakteret e favorshme.



Silica

Ndihmon në parandalimin e vyshkjes së gjetheve dhe shton peshën dhe jetëgjatësinë e frutave.



Cloner

Xhel shumimi. I reziston ndotjes tërthore. Ka një jetëgjatësi prej 10 vjetësh.



Kimistë dhe konsulentë për hortikulturën që prej vitit 1966

www.floramax.com  [@floramaxnutrients](https://www.instagram.com/floramaxnutrients)



ml / L	Kohëzgjatja (javë)	Dritë në ditë (orë)	VegaFlora A+B		Root-XS	Flowering Enhancer	OrganaBud	Resin-XS	System Maintenance	Silica	EC finale mS/cm (Shtoni në EC-në e ujit)
			A#	B#							
Procesi i prerjeve dhe fidanëve*	1 - 2 javë	18 orë	1.7ml	1.7ml	2ml				1ml		1.0
Faza e hershme vegetative	1 - 2 javë	18 orë	2.4ml	2.4ml	2ml		1ml		1ml	0.1ml	1.4
Faza e mesme e vonshme vegetative	2 - 4 javë	18 orë	3.0ml	3.0ml	2ml		2ml		1ml	0.1ml	1.8
Faza e çeljes së hershme	2 - 3 javë	12 orë	3.0ml	3.0ml	0.5ml	2ml	2ml		1ml	0.1ml	2.0
Faza e mesme e vonshme e çeljes	3 - 8 javë	12 orë	2.4ml	2.4ml	0.5ml	2ml	1ml	3ml**	1ml	0.1ml	2.1

Versioni 23 maj 20: Për informacione më të fundit vizitoni faqen e internetit <https://www.floramax.com/dosage-calculator>. Kjo tabelë për përgatitjen e dozës shërmbim vetëm si udhëzues.

UDHËZIME (Sistemi hidroponik/ Fibra të arrës së kokosit/ Dhe)

HAPI 1. Përgatitja e dozës

Mbushni rezervuarin e lëndëve ushqyese me ujë dhe shtoni A+B dhe aditivë. Shtoni sipas sekuencës së treguar në tabelë (nga e majta në të djathtë) dhe përzijeni tërësisht pas çdo shtese. MOS shtoni një "cal-mag" në këtë tretësirë ose tejkalonni vlerën përfundimtare të EC me më shumë se 0.2mS/cm.

****Resin-XS:** Përdorni deri në 4ml/L për bimët që duan shumë pleh.

***Sistemet DWC :** Për VegaFlora 'A' dhe 'B', ulni përqindjen e dozës në tabelë me 0.7ml/L për të gjitha fazat përveç Prerjeve & Fidanëve.

HAPI 2. Kontrolli i pH

Kontrolli që pH të jetë ndërmjet nivelit 5.0 dhe 6.5. Për disa ujëra të kripura është më mirë që pH të ulet ndërmjet nivelit 5.0 dhe 5.5.

HAPI 3. Frekuenca e ushqyerjes

Në përgjithësi, përdorni këtë tretësirë ushqyese sa herë që vadisni.



*Përdorni CLONE SPRAY dhe CLONER për prerjet dhe farat.

HAPI 4. Mirëmbajtja

• Ruani temperaturën e lëndës ushqyese ndërmjet 20-25 °C (68-77 °F). Mbuloni rezervuarin për të parandaluar avullimin dhe ekspozimin ndaj dritës.

• **Sistemet hidroponike të riciklimit:** Kontrolloni çdo ditë pH dhe EC. Zëvendësoni lëndën ushqyese çdo 7-10 ditë.

• **Sistemet me fibra të arrës së kokosit ose dhe:** Shpëlani me ujë substratin çdo 1-2 javë.

US to Metric Conversion	tsp	tbsp	Fl.oz.	Qrt	US Gal
	5ml	15ml	30ml	946ml	3.78 litres