

FloraMax

Tableau de Dosage



FloraMax VegaFlora A+B

Nutriments professionnels en deux parties pour la culture hydroponique, le sol ou la fibre de coco :

- Formule unique pour les végétaux et la floraison. Fonctionne fortement de la graine à la récolte - carences nulles. Pas de « cal-mag » requis, même dans de l'eau purifiée à l'osmose inversée ou dans des eaux douces.
- Doté d'un pH très stable et complètement soluble. Ne bloque pas les goûteurs.
- Ne contient aucun ingrédient inutile. Ceci favorise de meilleurs goûts.
- Très simple à utiliser. Ne nécessite aucune procédure de dosage fastidieuse : vous n'avez simplement qu'à mesurer, à verser, puis à remuer. Pour le sol et la fibre de coco, aucun ajustement du pH n'est requis dans la plupart des types d'eaux.

Root-XS



Augmente la croissance racinaire de manière très significative. Minimise le stress de transplantation et contribue à accélérer le cycle de culture. Produit un feuillage et des fruits plus sains et plus verts, avec moins de signes de stress. Formule au pH neutre qui ne causera pas de mousse, d'odeurs ou de pellicules biologiques.



Resin-XS

Le renforteur de floraison no 1 pour les cultivateurs sérieux. Améliore la teneur en résine et en huile et aide à promouvoir un poids plus élevé des fruits. Ne contient aucune hormone, et ne cause ni odeur nauséabonde ni accumulation dans les réservoirs.

Flowering Enhancer



Additif de stimulation de la floraison trois en un, qui facilite la croissance et augmente la taille des fleurs: 1. Il s'agit d'un additif PK. 2. Contient également du calcium, du magnésium et du fer. 3. Maintient le pH en dessous de 6,5 et améliore la stabilité du pH de 500 %, en général.



System Maintenance

Empêche les blocages de nutriments. Est compatible avec les additifs organiques et les bactéries bénéfiques.

Cloner



Gel de clonage. Résiste à la contamination croisée. A une durée de vie de 10 ans.



Chimistes analytiques et consultants en horticulture depuis 1966

www.floramax.com  [@floramaxnutrients](https://www.instagram.com/floramaxnutrients)



ml / L	Lumière par jour (heures)	VegaFlora		Root-XS	Flowering Enhancer	Resin-XS	System Maintenance	Objectif d' EC (mS/cm)
		A [#]	B [#]					
Boutures et semis* (1 à 2 semaines)	18 h	1.7ml	1.7ml	2ml			1ml	1.0
Phase végétative	Semaine 1	18 h	2.4ml	2.4ml	2ml		1ml	1.4
	Semaine 2	18 h	2.7ml	2.7ml	2ml		1ml	1.6
	Semaine 3	18 h	3.0ml	3.0ml	2ml		1ml	1.8
	Semaine 4	18 h	3.0ml	3.0ml	2ml		1ml	1.8
Phase de floraison	Semaine 5	12 h	3.0ml	3.0ml	1ml	2ml	1ml	2.0
	Semaine 6	12 h	3.0ml	3.0ml	1ml	2ml	1ml	2.0
	Semaine 7	12 h	2.7ml	2.7ml	0.5ml	2ml	1ml	2.1
	Semaine 8	12 h	2.5ml	2.5ml	0.5ml	2ml	2ml	2.1
	Semaine 9	12 h	2.4ml	2.4ml	0.5ml	2ml	3ml**	2.2
	Semaine 10	12 h	2.4ml	2.4ml	0.5ml	2ml	3ml**	2.2
	Semaine 11	12 h	2.4ml	2.4ml	0.5ml	2ml	3ml**	2.2
	Semaine 12	12 h	2.4ml	2.4ml		2ml	3ml**	2.2

FACULTATIF

Version du 23 mai 2020 : Pour les mises à jour, voir <https://www.floramax.com> | Ce tableau des dosages sert uniquement de guide.

Instructions (hydro/coco/sol)

ÉTAPE 1. Dosage

Remplissez le réservoir de nutriments avec de l'eau, puis ajoutez A+B et les additifs. Ajoutez les ingrédients selon la séquence indiquée dans le tableau (de gauche à droite), en remuant bien après chaque addition. **N'ajoutez PAS de Cal-Mag à cette solution.**

**RESIN-XS : Utilisez jusqu'à 4 ml/L pour les plants gourmands.

* Systèmes de DWC : Reportez-vous au tableau des doses spécialisées présenté sur www.floramax.com/resources/.

ÉTAPE 2. Contrôle du pH

Vérifiez que le pH se situe entre 5,0 et 6,5. Pour certaines eaux salées, il est préférable d'abaisser le pH entre 5,0 et 5,5.

ÉTAPE 3. Fréquence d'alimentation

En règle générale, utilisez cette solution nutritive à chaque arrosage.



*Utilisez
CLONER pour
les boutures

ÉTAPE 4. Entretien

- **Qualité de l'eau** : L'eau purifiée par osmose inverse est idéale. Évitez les eaux avec une EC au-dessus de 0,2 mS.
- **Tableau de dose d'EC cible** : Ces chiffres s'appliquent avec une eau brute dont l'EC est de 0,0 mS. Si l'eau a une EC de disons 0,1 mS, 0,1 doit être ajouté à la EC cible du tableau de dose. Pour éviter les brûlures du feuillage, évitez de dépasser les cibles de EC de plus de 0,2 mS.
- **Systèmes hydroponiques à recirculation** : Vérifiez le pH et la conductivité électrique quotidiennement. Remplacez le nutriment tous les 7 à 10 jours.
- **Systèmes à circuit ouvert pour la fibre de coco ou le sol** : Rincez le milieu à l'eau claire toutes les 1 à 2 semaines.
- **Réservoir de nutriments** : Maintenez la température des éléments nutritifs entre 20 et 25 °C (68 à 77 °F). Couvrez le réservoir pour éviter l'évaporation et l'exposition à la lumière.