

# FloraMax

## Tabela e dozave

### FloraMax Veg-1



Veg-1 është një lëndë ushqyese profesionale me 1 pjesë për sistemet hidroponike, dhe ose fibra të arrave të kokosit:

- Formulë e vetme për vegetacion dhe celje. Vepron fort nga fara në korrije - mungesat e nikelit. Nuk kërkohet "kal-mag" as në ujërat me "RO" apo pa minerale.
- Ideale për ujëra të kripëra.
- Përqendrim i lartë i pH dhe plotësisht i tretshëm. Nuk i bllokton tubat dhe filtrat.
- Nuk përmban përbërës të panevojshëm. Kjo stimulon aroma më të mira.
- E lehtë për t'u përdorur. Proceduar për përgatitjen e dozës nuk janë të lodhshme - thjesht mateni, derdheni, pastaj përziejeni. Për dheun dhe fibrat e arrës së kokosit, rregullimi i pH në pjesën më të madhe të ujërave nuk është i nevojshëm.

#### Root-XS



Siguron harlisje të rrënjës. Minimizon vyshkjen nga zhvendosja dhe ndihmon në nxitjen e një cikli më të shpejtë të kulturave. Prodhon gjethe më të gjelbra, të shëndetshme dhe fruta me më pak shenja fishkaje. Formula me pH neutral nuk do të shkaktojë shkurim, aroma apo biofilma.

#### Resin-XS



Fuqizuesi #1 i lulëzimit për kultivues të përkushtuar. Përmirëson përmbajtjen e rezinit dhe vajit dhe ndihmon në nxitjen e peshës më të madhe të frutave. Është pa hormone dhe nuk shkakton erë të keqe ose grumbullime në rezervuar.

#### Flowering Enhancer



Aditiv tre në një për celjen e luleve që e bën më të lehtë kultivimin dhe rrit madhësinë e luleve:

1. Është një aditiv fosfori dhe kaliumi,
2. Përmban gjithashtu kalcium, magnez dhe hekur,
3. Ndihmon në ruajtjen e pH nën 6.5.

#### OrganaBud



Nxit më shumë sythe, internoda më të ngushta, pistilë më të gjallë dhe aromë të përmirësuar. Përmban leshterik deti "Ascophyllum Nodosum" dhe shumë organikë thelbësor të pastër. Pa "PGR". Rezistent ndaj shkurimës, aromave apo bllokimeve. Aditivi ideal për rritje tregtare, aeroponik ose "DWC".

#### Growth-XS

Përdorni Growth-XS në javën e 2-të ose të 3-të vegetative për të përshpejtuar rritjen e gjeteve. Ndihmon në uljen e gjatësisë së fazës vegetative me 1-3 javë.



#### Ca-Mg-Fe

Cal-Mag + hekur + të gjitha elementet kimike\*: 1. Shumica e mungesës së lëndëve ushqyese: ndodh për shkak të elementeve kimike, 2. Shumë lëndë ushqyese bazë kanë mungesë të elementeve kimike. \*Fe, Cu, Mn, Zn, Mo, B.



#### Clone Spray



Ndihmon në përmirësimin e shkallës së suksesit dhe shëndetit të kloneve dhe fidanëve. Ai ka një surfaktant të integruar.

#### System Maintenance



Parandalon bllokimet e lëndëve ushqyese. Është në përputhje me aditivët organikë dhe bakteret e favorshme.

#### Silica



Përmban 16% silicë, si p.sh. monosilicik dhe acid metasilicik. Ndihmon në parandalimin e vyshkjes së gjeteve dhe shton peshën dhe jetëgjatësinë e frutave.

#### Cloner



Xhel shumimi. I reziston ndotjes tërthore. Ka një jetëgjatësi prej 10 vjetësh.



Kimistë dhe konsulentë për hortikulturën që prej vitit 1966

[www.floramax.com](http://www.floramax.com)

[@floramaxnutrients](https://www.instagram.com/floramaxnutrients)



ml / L		Dritë në ditë (orë)	Veg-1 EC	Root-XS EC	Flowering Enhancer EC	OrganaBud (0-0-2) EC	Resin-XS EC	System Maintenance	Silica	Norma EC (mS/cm)
Procesi i prerjeve dhe fidanëve* (1-2 javë)		18 orë	3.5ml 0.87	2ml 0.1		1ml 0.07		1ml		1.0
Faza vegetative	Java 1	18 orë	5.2ml 1.3	2ml 0.1		1ml 0.07		1ml	0.1ml	1.4
	Java 2	18 orë	5.8ml 1.45	2ml 0.1		1ml 0.07		1ml	0.1ml	1.6
	Java 3	18 orë	6.4ml 1.6	2ml 0.1		2ml 0.15		1ml	0.1ml	1.8
	Java 4	18 orë	6.4ml 1.6	2ml 0.1		2ml 0.15		1ml	0.1ml	1.8
Faza e çeljes	Java 1	12 orë	5.8ml 1.45	2ml 0.1	2ml 0.4	2ml 0.15		1ml	0.1ml	2.1
	Java 2	12 orë	5.8ml 1.45	2ml 0.1	2ml 0.4	2ml 0.15		1ml	0.1ml	2.1
	Java 3	12 orë	5.8ml 1.45	2ml 0.1	2ml 0.4	2ml 0.15		1ml	0.1ml	2.1
	Java 4	12 orë	5.2ml 1.3		2ml 0.4	2ml 0.15	2ml 0.3	1ml	0.1ml	2.2
	Java 5	12 orë	5.2ml 1.3		2ml 0.4	2ml 0.15	2ml 0.3	1ml	0.1ml	2.2
	Java 6	12 orë	5.2ml 1.3		2ml 0.4	2ml 0.15	2ml 0.3	1ml	0.1ml	2.2
	Java 7	12 orë	5.2ml 1.3		2ml 0.4	2ml 0.15	2ml 0.3	1ml	0.1ml	2.2
	Java 8	12 orë	5.2ml 1.3		2ml 0.4	2ml 0.15	2ml 0.3	1ml	0.1ml	2.2

**Versioni 25 gusht 22:** Për informacione më të fundit vizitoni faqen e internetit <https://www.floramax.com/dosage-calculator>. Kjo tabelë për përgatitjen e dozës shërbim vetëm si udhëzues.

## Udhëzime (hidro/kokos/dhe)

### HAPI 1. Përgatitja e dozës

Sasinë më të madhe të ujit hidheni në rezervuar. Më pas shtoni çdo produkt, duke i hedhur sasinë e mbetur të ujit. Shtojeni sipas sekuençës së treguar në grafik (nga e majta në të djathtë) dhe përzijeni plotësisht pas çdo shtimi. Mos shtoni KURRË klor ose preoksid. Shmangni shtimin e "cal-mag".

EC: (Për përdorim komercial) Kontribut i EC (mS/cm).  
\*Sistemet "DWC": [www.floramax.com/resources](http://www.floramax.com/resources)

### HAPI 2. Kontrolli i pH

Kontrolli që pH të jetë ndërmjet nivelit 5.0 dhe 6.4. Për disa ujëra të kripura është më mirë që pH të ulët ndërmjet nivelit 5.0 dhe 5.5.

### HAPI 3. Frekuenca e ushqyerjes

Në përgjithësi, përdorni këtë tretësi të ushqyese sa herë që vadisni.



\*Përdorni CLONE SPRAY dhe CLONER për prerjet dhe farat

### HAPI 4. Mirëmbajtja

- **Maksimizimi i qëndrueshmërisë së lëndëve ushqyese:** Mbajeni rezervuarin të mbuluar, dhe nëse është e mundur, MOS përdorni pompë oksigjeni.
- **Sistemet hidroponike të riciklimit:** Kontrolloni çdo ditë pH dhe EC. Zëvendësoni lëndën ushqyese çdo 7-10 ditë.
- **Sistemet me fibra të arrës së kokosit ose dhe:** Shpëlani me ujë substratin çdo 1-2 javë.
- **Cilësia e ujit:** Uji me RO është ideal. Shmangni ujërat me EC mbi 0.2 mS.
- **Mungesa e lëndëve ushqyese:** Në rast mungese, përdorni 0.5-1ml/L (2-4ml/Gal) FloramaX Ca-Mg-Fe.
- **Norma "EC" në tabelën e dozave:** Këto numra zbatohen me ujin e papërpunuar me EC prej 0.0 mS. Nëse uji ka një EC le të themi 0.1 mS, në "normën EC" në tabelën e dozave duhet të shtohet 0.1. Për të parandaluar djegien e gjetheve, shmangni tejkalinim e normave EC me më shumë se 0.2 mS.



**GROWTH-XS**  
Ndihmon në uljen e gjatësisë së fazës vegetative me 1-3 javë.