

FloraMax

Tabla de Dosificación

FloraMax VegaFlora A+B



Nutriente profesional de 2 partes para hidroponía, suelo o fibra de coco:

- Fórmula única para desarrollo vegetativo y floración. Tiene un gran rendimiento desde la semilla hasta la cosecha, sin deficiencias. No se requiere un aditivo de calcio y magnesio, incluso en aguas de ósmosis inversa o suaves.
- pH altamente estable y totalmente soluble. No obstruye los goteros.
- No contiene ingredientes innecesarios. Esto promueve un mejor sabor.
- Muy fácil de usar. Sin tediosos procedimientos de dosificación: solo mida, vierta y remover. Para suelo y fibra de coco, no requiere de ajustes en el pH para la mayoría de aguas.

Root-XS



Produce un crecimiento explosivo del sistema radicular. Minimiza el estrés provocado por el trasplante y ayuda a promover un ciclo de cosecha más rápido. Produce un follaje más verde y sano, y frutas con menores señales de estrés. Fórmula de pH neutro que no produce espuma, olores o biopelículas.

Resin-XS



El acelerador de floración número 1 para productores serios. Mejora el contenido de resina y aceite y ayuda a promover un mayor peso de la fruta. No contiene hormonas y no provoca malos olores ni acumulaciones en el depósito.

Flowering Enhancer



Aditivo de floración tres en uno que facilita el crecimiento y mejora el tamaño de las flores. 1. Es un aditivo de PK, 2. También contiene calcio, magnesio y hierro, 3. Bloquea el pH por debajo de 6.5 y mejora la estabilidad del pH, generalmente a razón de un 500 %.

OrganaBud



Induce más sitios de floración, entrenudos estrechos, pistilos más vibrantes y un mejor aroma. Contiene algas marinas "Ascophyllum nodosum" además de muchos compuestos esenciales orgánicos purificados. No contiene "PGR". Resistente a la formación de espuma, olores y obstrucciones.

Growth-XS

Use Growth-XS en las semanas 2-3 de crecimiento vegetativo para acelerar el crecimiento del follaje. Ayuda a reducir de 1 a 3 semanas la duración de la fase vegetativa.



Ca-Mg-Fe

Calcio-magnesio + hierro + el espectro total de elementos traza: **1.** Muchas deficiencias de nutrientes se deben a elementos traza, **2.** Muchos nutrientes base son deficientes en elementos traza. *Fe, Cu, Mn, Zn, Mo, B.



Clone Spray

Ayuda a promover la tasa de éxito y el vigor de los clones y las plántulas. Incluye un agente humectante incorporado.



System Maintenance

Evita las obstrucciones causadas por los nutrientes. Es compatible con aditivos orgánicos.



Silica

Contiene 16 % de sílice en forma de ácido monosilícico y metasilícico. Ayuda a evitar el marchitamiento foliar e incrementa el peso y la vida de anaquel de la fruta.



Cloner

Gel de clonación. Resiste la contaminación cruzada. Tiene una vida de anaquel de 10 años.



Químicos analíticos y consultores hortofrutícolas desde 1966

www.floramax.com

@floramaxnutrients



ml / L	Luz por día (horas)	VegaFlora		Root-XS	Flowering Enhancer	OrganaBud (0-0-2)	Resin-XS	OPCIONAL						
		A#	EC					B#	EC	System Maintenance	Silica	EC objetivo (mS/cm)		
Esquejes y plántulas* (1-2 semanas)		18 h.	1.7ml	0.48	1.7ml	0.41	2ml	0.1	1ml	0.07	0.07	1ml		1.0
Fase vegetativa	Semana 1	18 h.	2.0ml	0.56	2.0ml	0.48	2ml	0.1	1ml	0.07	0.07	1ml	0.1ml	1.2
	Semana 2	18 h.	2.0ml	0.56	2.0ml	0.48	2ml	0.1	1ml	0.07	0.07	1ml	0.1ml	1.2
	Semana 3	18 h.	2.4ml	0.67	2.4ml	0.57	2ml	0.1	2ml	0.15	0.15	1ml	0.1ml	1.5
	Semana 4	18 h.	2.4ml	0.67	2.4ml	0.57	2ml	0.1	2ml	0.15	0.15	1ml	0.1ml	1.5
Fase de floración	Semana 1	12 h.	2.0ml	0.56	2.0ml	0.48	2ml	0.1	1.5ml	0.15	0.15	1ml	0.1ml	1.6
	Semana 2	12 h.	2.0ml	0.56	2.0ml	0.48	2ml	0.1	1.5ml	0.15	0.15	1ml	0.1ml	1.6
	Semana 3	12 h.	2.0ml	0.56	2.0ml	0.48	2ml	0.1	1.5ml	0.15	0.15	1ml	0.1ml	1.6
	Semana 4	12 h.	2.1ml	0.59	2.1ml	0.50		1.5ml	0.3	2ml	0.15	1.5ml	0.1ml	1.8
	Semana 5	12 h.	2.1ml	0.59	2.1ml	0.50		1.5ml	0.3	2ml	0.15	1.5ml	0.1ml	1.8
	Semana 6	12 h.	2.1ml	0.59	2.1ml	0.50		1.5ml	0.3	2ml	0.15	1.5ml	0.1ml	1.8
	Semana 7	12 h.	2.1ml	0.59	2.1ml	0.50		1.5ml	0.3	2ml	0.15	1.5ml	0.1ml	1.8
	Semana 8	12 h.	2.1ml	0.59	2.1ml	0.50		1.5ml	0.3	2ml	0.15	1.5ml	0.1ml	1.8

Versión 25 de agosto de 2022 : Para actualizaciones, visite <https://www.floramax.com> | Esta tabla de dosificación sirve como una guía únicamente.

Instrucciones: Sistemas DWC

PASO 1. Dosificación

Coloque la mayor parte del agua en el depósito. Después, agregue cada producto y, a continuación, el agua restante. Agregue los productos en la secuencia que se muestra en la tabla (de izquierda a derecha) y revuelva bien después de agregar cada producto. **NUNCA** agregue cloro o peróxido. Evite agregar un "cal-mag"

EC: (Para uso comercial) aportación de EC (mS/cm).

PASO 2. Control del pH

Verifique que el pH se encuentre entre 5.0 y 6.4. En algunas aguas con contenido de sales, se recomienda reducir el pH a entre 5.0 y 5.5.

PASO 3. Frecuencia de alimentación

Generalmente, esta solución de nutriente se puede usar en cada riego.



*Use CLONE SPRAY y CLONER para esquejes y semillas

PASO 4. Mantenimiento

- **Maximizar la estabilidad de nutrientes:** Cubra el depósito para evitar la evaporación y la exposición a la luz.
- **Sistemas de recirculación hidropónica:** Verifique diariamente el pH y la EC. Reemplace el nutriente cada 7 a 10 días.
- **Calidad del agua:** El agua de ósmosis inversa es ideal. Evite agua con una EC por encima de 0.2 mS.
- **Deficiencias de nutrientes:** Si se presentan deficiencias, use FloraMax Ca-Mg-Fe a 0.5-1 ml/L (2-4ml/Gal).
- **Tabla de dosificación de "EC objetivo":** Estos números se aplican con agua sin tratar con EC de 0.0 mS. Si el agua tiene una EC de, por ejemplo, 0.1 mS, se debe añadir 0.1 a la EC objetivo de la tabla. Para evitar la quemadura del follaje, evite exceder la EC objetivo en más de 0.2 mS.



GROWTH-XS
Ayuda a reducir de 1 a 3 semanas la duración de la fase vegetativa